

WIENER Entomologische Monatschrift.

Redaction und Expedition:
Landstrasse, Gärtnergasse Nr. 45.

In Commission bei
Carl Gerold's Sohn, Stadt Nr. 625.

Nr. 10.

V. Band.

October 1861.

Lepidoptera nova

a D^re. Carolo Semper^{*)} in insulis Philippinis collecta diagnosibus
exposuerunt C. et R. Felder.

Series prima.

1. Papilio Semperi Nob.

*Alis utrinque piceo-nigris, anticis dimidio apicali dilutioribus, nigro
strigatis, posticis profunde sinuato-dentatis, dente ad ramum
medianum tertium caudaformi, maculis duabus posterioribus
conuatis aliisque sex marginalibus lunaeformibus, supra fumatis,
subtus dilute erythrinis, corpore laete rubro, thorace et abdome
supra albido pilosis, hoc maculis lateralibus bifariis aliisque
magnis ventralibus atris. ♀*

Luzon. — Proximus affinis speciosi hujus *Papilionis* est *P. Varuna*
White (*Chara Westw.*), cuius magnitudinem superat, sed forma
alarum longe diversa et illi *P. Hectoris* L. subsimilis.

2. Papilio Annae Semper in litt.

*Alis anticis margine externo recto, utrinque nigricantibus, striis
quatuor cellularibus aliisque externis inter venas biuatim con-*

^{*)} Dr. Semper extremo anno 1858 Manilam advenit. Augusto 1859
Zamboangam insulae Mindanao profectus, mense Februario 1860 Manilam
reversus est. Duoibus mensibus post in regiones septentrionales insulae Luzon iter
fecit et ineunte Augusto in Aparri, extrellum septentrionalem locum, pervenit.
Inde mense Novembre Manilam reversus Aprili currentis anni, postquam
servum insecta collecturum Mindoro in insulam misit, iterum in septentrionem
abiiit, nunc autem occidentalia versus litora nullo ab entomologo antea
visitata. Eodem fere tempore Dominus Lorquin, peregrinationibus in California
entomologis bene cognitus, meridionales insulae Luzon partes exploravit.

junctis albidis, posticis caudatis, atris, utrinque plaga discali, venis in maculas septem dirisa, ♂ris albida, ♀nae alba maculisque septem submarginalibus, in ♂re supra brunneis, ochraceo aspersis, subtus albidis, in ♀na utrinque albidis, infimis tribus majoribus roseo tinctis, abdomine ♂ris lateribus ochraceo fasciatis, ♀nae regione anali rubra.

Mindoro. — *P. Jophoni* Gray affinis, sed statura minoris.

3. *Papilio Daedalus* Boisd. in litt.

Alis fuscis, supra a basi ultra medium dense viridi conspersis, fascia discali subobliqua dilute viridi, in posticis aequilata, margini externo parallela, his supra lunulis quinque atomariis submarginalibus viridibus, subtus margine toto externo late brunneo, maculis septem fulris nigro cinctis, prima costali excepta introrsum plumbeo atomatis. ♂ ♀

Luzon. Coll. Musei Caes. Vienensis. (Manila. Hügel), Semper et Felder. (Lorquin). — *P. Bramae* Guér. valde affinis, major autem et alae posticae magis elongatae, supra fascia angustiore, a ramo primo subcostali incipiente, band margini anali sed margini externo parallela, subtus margine brunneo multo latiore.

4. *Papilio Stratocles* Nob.

Alis nigro-fuscis, maculis radiiformibus inter venas, anticarum maculis cellularibus hieroglyphice implicatis binisque pone cellulam, posticarum cellula tota virescenti-albis, supra serie macularum concolorum, subtus anticarum maculis submarginalibus plus minus rotundatis, posticarum lunulis angustis submarginalibus aliisque in sinibus marginis albis. ♂

Mindanao. — Magnitudo *P. Macarei* Godt., cui proximus.

5. *Pieris Georgina* Nob.

Alis anticis utrinque albis, basi late cinerea, macula magna tetragona in costae medio limboque externo albo maculato, introrsum sinuato nigricantibus, posticis supra canescensibus, macula discali aliisque exterioribus in fundo nigricante, magnis elongatis albis, subtus violaceo-nigricantibus, macula ad costae basin aliisque paginae superioris niveis, flaro foetis. ♀

Luzon, in altitudine 2000 ped. — In honorem Domini Georgii Semper, qui species a fratre collectas benevolenter nobiscum com-

municavit, venustam hanc *Pieridem*, *P. Antithisbe* Hübn. paulo minorem, nominamus.

6. *Pieris Aegis* Nob.

Alis supra fuscescentibus, venis medianis, anticarum fascia discali obliqua angusta fulgurato-angulosa, posticarum macula magna discali diffusa sulphureo-albidis, his subtus pallide sulphureis, fascia lata terminali obsoleta saturatiore. ♀

Mindanao. — Species peculiaris magnitudine et facie *Anthopsycharum*.

7. *Pieris Phoebe* Nob.

Alis supra albis, anticis macula discali rotundata limboque terminali apud ramum primum medianum recte truncato, albo bimaculato nigro-fuscis, subtus posticis ochraceo-albidis, strigis duabus flexuosis brunneis, margine costali flavo, regione anali sulphurea. ♂

Luzon. Coll. Semper et Felder. — *P. Pandionae* Hübn. accedens, sed minor.

8. *Pieris Nephele* Boisd. in litt.

Alis anticis ♂ris supra nigro-fuscis, fascia lata subtrigona, apice macula terminata albida, ♀nae albis, costa limboque terminali fuscis, posticis illius saturate flavis, limbo nigro-fusco, hujus albis, fusco limbatis, subtus anticis ♂ris multo pallidioribus, area discali subtrigona alba maculaque subcostali flava, ♀nae basi maculaque costali flaris, maculis exterioribus griseis, posticis utriusque sexus flavis, limbo externo introrsum repandotentato dilute fusco, in ♀na macula griseo-lilascente tribusque luteis ornata.

Luzon. Coll. Semper et Felder. (Lorquin). — Statura *P. Paulinae* Fabr., ad cuius sectionem pertinet.

9. *Eronia Phocaea* Nob.

Alis supra caerulescenti-albidis, venis late nigro-fusco limbatis anticarum lineis duabus cellularibus, posticarum unica nigro-fuscis, his limbo externo lato usque ad ramum medianum primum marginaque interno brunneis, subtus omnibus multo pallidioribus. ♂

Mindanao. Coll. Semper et Felder. — *E. Tritaea* nostrae proxima, at statura minor, alae breviores et color fuscus praedominans.

10. Danais vitrina Nob.

Alis utrinque nigro-fuscis, anticarum area interna quadripartita, plaga subapicali tripartita, maculis tribus costalibus aliisque septem submarginalibus, posticarum area magna basali venis divisa ritreis, his subtus serie duplii submarginali macularum inaequalium argenteo-albarum. ♂

Luzon. Coll. Semper et Felder. (Lorquin). — *D. Aglea* Cram.
et affinibus minor.

11. Danais Anapis Nob.

Alis subhyalinis, fusco venatis, basi flavido tinctis, anticarum fasciola irregulari discali limboque externo grosse albo maculato, introrsum irregulariter crenato, posticarum maculis quinque exterioribus margineque externo introrsum crenato albo maculato fuscis. ♂

Luzon. Coll. Semper et Felder. — Ad sectionem *D. vitreae* Blanch. (*Oenopiae* Nob.) pertinet, signaturis vero *D. Gaurae* Horsf. similior est.

12. Cethosia insularis Nob.

Alis supra lateritiis vel cinnabarinis, anticarum strigis cellularibus extimoque albo signato, posticarum seriebus duabus macularum pone discum, valde approximatis margineque lato externo nigro-fuscis, subtus omnium fere dimidio basali lateritio, fasciolis virescenti-albidis, nigro strigatis ornato, fascia discali sulphurea, nigro notata limboque externo pone hanc ochraceo-fulvescente, maculis seriatis cuneiformibus albis, nigro notatis, aliisque ordinariis marginalibus lunatis, in utrisque alis conformibus. ♂

Luzon. Coll. Semper et Felder. (Lorquin). Amboina. (Doleschall). Coll. Felder. — *C. Biblid* Drury, cuius subspecies geographicæ, valde similis, sed statura minore, dentibus alarum brevioribus, linea marginali undulosa supra in posticis obsoleta, subtus in omnibus fere conformi, margine fusco alarum posticarum latiore, maculis nigris in earum pagina inferiore magis approximatis, maculis ideo cuneatis paginae inferioris brevioribus et praecipue absentia lunulae analis albae nigro cinctae dignoscitur. Specimen unicum in Amboina a cel. Doleschall captum, quod aberrationem *C. Biblidis* olim putavimus, a philippino forma signaturisque alarum anticarum et colore paginae superioris sat discrepat.

13. Cirrochroa Tyche Nob.

Alis supra dilute fulvescentibus, strigis duabus exteruis communibus angulosis, anticarum margine angusto, posticarum striga discali flexuosa maculisque quinque punctiformibus exterioribus nigris, subtus omnibus pallidioribus lilacino submicanibus, fascia angusta discali opalina, introrsum fulvo marginata maculisque atris pone eam, singulis fundo fulvo impositis. ♂

Mindoro. — Minor, quam *C. Thais* Fabr., aliae anticae obtusiores et posticae paullo breviores, quam in congeneribus.

14. Cirrochroa fasciata Nob.

Atella fasciata Nob. Wien. Entom. Monatschrift. IV. p. 236.

Alis supra fuscis, venis discoidalibus anticarum brunneo limbatis, subtus omnibus pallide brunneis, regione basali multo dilutiore, fascia discali in anticis apud ramum medianum tertium desinente, altera exteriore in anticis maculari, in posticis introrsum maculis nigris terminata serieque submarginali lunularum supra pallide fulvescentibus vel ochraceis, subtus multo pallidioribus. ♂

Mindoro. Coll. Semper et Felder. Sumatra. (Ida Pfeiffer)

Coll. Mus. Caes. Viennens. — Species distinctissima a congeneribus non solum posticis multo brevioribus anticarumque margine externo magis obliquo, sed etiam statura dimidio minore recedens hancque ob causam *Atellis* similior.

15. Zethera Pimplea Erichs.

♀ *Alis supra fuscis, subtus multo pallidioribus, utrinque maculis externis binatis aliisque marginalibus lunulatis albis, supra caerulecenti atomatis, anticis maculis quatuor rittaeformibus circa venam medianam, tribus adjacentibus exterioribus rotundatis tribusque magnis subapicalibus connatis ejusdem coloris, posticis dimidio basali albo radiato punctisque exterioribus albis.*

Luzon. Mindanao. Coll. Musei Caes. Viennensis (Manila Hügel), Semper et Felder. (Lorquin). — Minor, quam mas a cel. Erichson descriptus et non signaturis tantum, sed et forma alarum diversa.

16. Zethera Musa Nob.

Alis supra obscure fuscis, maculis marginalibus albis, anticarum

maculis septem exterioribus, posticarum fascia externa lata abbreviata sulphureo-albis, subtus multo pallidioribus, maculis marginalibus triangularibus fasciaque exteriore maculari posticarum albis. ♂

Mindanao. Coll. Semper et Felder. — *Z. Pimplea* minor et margine externo alarum anticearum magis concavo distans.

17. *Zethera hestiooides* N. ob.

Alis opalino-albis, nigro renatis, maculis coniformibus apud venarum extima, aliis rotundatis interjectis, in anticis striga undulosa conjunctis, harum macula discali rotundata, posticarum macula grossa costali strigaque submarginali angulosa nigro-fuscis. ♂
Mindanao. — Species insignis, *Hestiarum* fere signaturis. Forma alarum fere ut in *Z. Pimplea* ♀, sed multo gracilior, statura quoque major.

18. *Adolias Calliphorus* N. ob.

Alis anticis supra brunneo-fuscis, lituris basalibus nigris, fascia postica obliqua aeneo-virescente, posticis fusco-nigris, fascia lata exteriore metallico-caerulea, omnibus subtus pallidissime aeneo-virescentibus, lituris in regione basali maculisque biseriatis pone discum, nigris. ♂

Luzon. Coll. Semper et Felder. — Eximia haec species ad sectionem *A. Palgunae* Moore pertinet.

19. *Lexias* *) *Panopus* N. ob.

Alis supra obscure fuscis, aeneo parum micantibus, anticearum striga postica submaculari, posticarum fascia exteriore sinuato-dentata, nigro maculata fulvo-ochraceis, subtus fulvo-brunneis, maculis insuper discalibus albido-caeruleis, anticis macula ocellari caerulescente in cellula, posticis ochraceo renatis. ♂

Luzon. Coll. Semper et Felder. — Magnitudo *L. Aeropi* L., cui proxima.

20. *Lexias Satrapes* N. ob.

Alis supra obscure cano-brunneis, violaceo-tinctis, ad basin aeneo-virescentibus, anticis a medio usque ad marginem albo maculatis, posticis fascia discali angusta metallico-caerulea macu-

*) *Lexiades* an vere ab *Adoliadibus* separandae sint, ulteriores observationes docebunt.

*lisque submarginalibus albis, omnibus subtus pallidioribus,
posticis undique ferrugineo marginatis, maculis obsoletis in
dimidio basali.* ♂

Luzon. Coll. Semper et Felder. — Praecedente major.

21. Charaxes Amycus Boisd. in litt.

*Atis supra saturate fulvis, antieis macula subcostali limboque externo
nigricantibus, hoc maculis fundi colore diviso, posticis breviter
bicaudatis, maculis submarginalibus subrhombatis confluentibus,
magnitudine decrescentibus, nigricantibus, albo notatis, omnibus
subtus lutescentibus vel rufo-brunnescentibus, strigis flexuosis
plumbeo-nigrescentibus, posticis fascia exteriore irregulariter
crenata fulvescente maculisque submarginatibus minutis plumbeo-
griseis, albo nigroque notatis.* ♂

Luzon. Coll. Semper et Felder. (Lorquin). — A Ch. Bernardo
Fabr. et ejus affinibus corpore graciliore formaque alarum posti-
carum bene differt.

22. Ergolis taeniata Nob.

*Alis supra ferrugineo-fuscescentibus, fascia lata communi leviter
sinuata, margini parallela taete fulva, angustissime nigro cincta,
posticarum in medio alae incipiente, subtus omnibus rufescenti-
brunneis, strigis binis basalibus, fascia angusta discali alteraque
exteriore multo latiore, posticarum albido atomata, marginem
internum versus angustata, extus acute repando-dentata rufo-
ferrugineis, anticis punto subcostali albo.* ♂

Luzon. — Facies paginae superioris fere *Ericalia*.

23. Ergolis Adelpha Nob.

*Alis supra fuscescentibus, basi ferrugineis, fascia communi obsolete
fulvescente, anticarum introrsum sinuata, posticarum angustiore,
integra, in medio alae incipiente, extus late fusco limbata,
subtus omnibus rufescenti-brunneis, strigis binis basalibus,
fascia angusta discali alteraque exteriore latiore, posticarum
albido atomata, aequilata, extus acute repando-dentata rufo-
ferrugineis, anticis punto subcostali albo.* ♂

Mindanao. — Praecedenti valde affinis, minor autem alisque anticis
magis angulatis.

24. Zeuxidia Semperi Nob.

Alis anticis margine externo subrecto, angulo interno distincto, margine interno paulum conrexo, posticis lobo anali brevi obtuso, omnibus supra fuscescentibus, saturate cyaneo nitentibus, anticarum fascia lata exteriore arcuata, posticarum limbo toto externo nitide caeruleis, his maculis duabus nigris albo cinctis in lobo anali, subtus omnibus lilascenti-brunneis, fasciis tribus in dimidio basali, quarta lata externa anguloso-dentata obsoleta marginaque rufescenti-brunneis, posticis ocellis duobus sat magnis. ♂

Luzon. — Statura *Z. Luxerii* Hübn. forma autem alarum valde diversa. Similior videtur *Z. Doubledayi* Westw.

25. Clerome Leucis Nob.

Alis supra cano-brunneis, posticis a basi ultra dimidium albis, subtus omnibus brunneis, strigis tribus fuscis, posticis ocellis duobus pone discum. ♂

Mindanao. Coll. Semper et Felder. — Specimen nostrum minus, quam *Cl. Arcesilaus* Fabr.

Ptychandra Nob. (πτυχάνδρα, plica, ἀριζό, mas.)

A *Debide* Boisd. Westw. oculis parce pilosis, cellula discoidali alarum anticarum multo breviore, earum vena costali et mediana basi fortiter incrassatis ramisque duobus ultimis medianis alarum posticarum sat remotis discrepat. Alae anticae ♂rum multo distinctius plicatae sunt et cellulam discoidalem breviorem et aliter formatam habent, quam ♀nae. In earum pagina superiore apud venam medianum fasciculus observatur pilorum areolam squamis elatioribus constitutam infra venam tegens. Ramus medianus primus ex parte inflata venae primariae et secundus proxime post eam (in eodem loco ut primus in ♀na) nascuntur. Ille apud originem interruptus, inter duas plicas currit, quarum superior infra rami secundi partem basalem bursulam format, in pagina inferiore bene conspicuam.

26. Ptychandra Lorquinii Nob.

Debis Lorquinii Boisd. in litt.

Alis anticis margine externo rectis, striga submarginali angulosa, posticis subcaudatis, omnibus ♂ris supra splendide violascenti-cyaneis, ♀nae fuscescentibus, anticis hujus ritta, fasciola maculisque duabus albis, subtus rufo-ferrugineis, dimidio

basali in ♂ re plumbeo-, in ♀ na albido strigato, anticis ocellis tribus conjunctis, posticis septem, primo costali multo majori.

Luzon. Coll. Musei Caes. Viennens. (Manila. Hügel), Semper et Felder. (Lorquin). — Magnitudo pulcherrimae hujus speciei eam *D. Rohriae* Fabr. aequat.

27. *Ragadia Luzonia* Nob.

Alis supra fuscescentibus, fascia communi discali ad antifarum apicem valde attenuata alteraque submarginali postifarum cretaceis, subtus omnibus saturioribus, fasciis quatuor obliquis dilute cretaceis ocellisque exterioribus seriatis, antifarum octo, postifarum septem atris, plumbeo pupillatis. ♂

Luzon. Coll. Semper et Felder. — *R. Crisiae* Hüb n. valde similis, alae autem breviores et anticae apice acutiores.

Acrophtalmia Nob.

Ragadiae Westw. sat affine, hocce genus differt ramo subcostali primo alarum antifarum ad cellulæ extimum oriente, vena disco-cellulari suprema in iis abortiva, ramis subcostalibus postifarum longius petiolatis, vena disco-cellulari superiore in iis praesente, inferiore angulum acutissimum formante, infra eum tantum plicae-formi, vena discoidal subrecta ramisque ultimis medianis vena disco-cellulari interveniente separatis.

28. *Acrophtalmia Artemis* Nob.

Alis fuscescentibus, disco albis, subtus singulis striga duplice submarginali angulosa obscuriore, antifarum ocello apicali, postifarum subanali magnis, nigris plumbeo binotatis, iride flava, aeneo micante. ♂

Luzon. Coll. Semper et Felder. (Lorquin). — Magnitudo *Yphitmarum*.

29. *Antheraea Semperi* Nob.

Alis ♂ ris supra cervino-fulvis, ad marginem externum cerrinis, ocello singularum minuto, colorato, linea vitrea diviso, ♀ nae ibidem saturate luteis, ocello singularum fenestrato, suborbiculari, in medio vena disco-cellulari, persecto, annulis tribus coloratis cincto, omnibus utrinque sexus strigis binis discalibus undulatis obsoletis tertiaque exteriore carnea, extus maculis albido atomatis adnata, antifarum obliqua continua, postifarum curvata, in ♂ re undulosa, subtus omnibus fulvo-brunneis,

strigis tribus communibus obsoletis, prima ferruginea, ocellum percurrente, corpore alis concolore, thoracis limbo antico supra cano, in ♀ na postice recte truncato.

Luzon. Coll. Semper et Felder. (Lorquin). — Valde similis
A. Rumphii amboinensi, at quarta parte minor et ♀ na ocellorum strigaeque alarum posticarum forma *A. Mylittae* accedens.

30. *Attacus Lorquinii* Nob.

Alis obscure rufo-brunneis, maculis fenestratis triangularibus, in ore multo minoribus, latere basali concavis, striga discata hyalina, intus nigro cincta, subtus pone eam fascia lata lilascente, nigro conspersa, margine externo cervino, striga flexuosa nigra alteraque ochracea diriso, anticis striga basali rix angulata subhyalina, extus nigro cincta plagaque apicali lilascenti-albida, striga sanguinea maculaque atra notata, posticis maculis submarginalibus subinflexis rubentibus, cervino-cinctis.

Luzon. Coll. Semper et Felder. (Lorquin). — Inter *A. Atlantem* L.
 et *Crameri* Nob. quasi medius.

Ueber *Colias Myrmidone* Esp.

Von A. Gartner in Brünn.

Diese behende Waldbewohnerin, welche gegen Ende Mai unsere Holzschläge scheu und unstat durchjagt, ist uns bezüglich ihrer ersten Stände bis jetzt noch fremd geblieben. Die Häufigkeit, in welcher sie Anfangs August in der zweiten Generation hier auftritt, bestimmte mich, in dieser Richtung einige Beobachtungen anzustellen, welche zwar durch die Lebhaftigkeit des Falters und durch das bergige Terrain, wo er sich herum tummelt, erschwert wurden, die mich aber doch zu dem erwünschten Ziele gelangen liessen.

Natürlich war es wieder das weibliche Geschlecht, welchem ich meine besondere Aufmerksamkeit zuwandte. Ich wählte hiezu Anfangs Juni eine Stelle, welche, wenn sie auch beschränkt war, es doch wegen ihrer topografischen Lage möglich machte, den vorbeiziehenden Myrmidonen ohne Hindernisse folgen zu können. Die Wiederholung mehrerer solcher Besuche führte mich endlich zu dem Momente, wo ein Weib sein Ei auf das Blatt des *Cytisus biflorus*, L'Herit. legte. Ich war nun im Besitze des Schlüssels zu ihrer Lebensgeschichte, aber